

XXXXV**Società Chimica
Italiana****Dipartimento di Chimica e
Farmacia
Università di Sassari
Istituto di Chimica
Biomolecolare del CNR di
Sassari****Comitato Scientifico:**

Prof. Paolo Scrimin
 Prof. Raffaele Riccio
 Prof. Roberto Ballini
 Prof. Valeria Conte
 Prof. Marco D'Ischia
 Prof. Gianluca Farinola
 Prof. Francesco Sannicolò


Conferenze Plenarie:

Dott. Catia Bastioli, Matrica/Novamont
 Dott. Walter Cabri, Indena
 Prof. Cinzia Chiappe, Uni Pisa
 Prof. Antonella Dalla Cort, Uni Roma1
 Prof. Bartolo Gabriele, Uni Calabria
 Prof. Cesare Gennari, Uni Milano
 Prof. Andrea Mazzanti, Uni Bologna
 Dott. Alessandro Mordini, CNR Firenze
 Prof. Carmen Nàjera, Uni Alicante
 Dott. Vincenzo Palermo, ISOF CNR Bologna
 Dott. Stefano Protti, Uni Pavia
 Dott. Haymo Ross, EurJOCWiley
 Prof. Claudio Trombini, Uni Bologna
 Dott. Antonio Zanotti-Gerosa, JohnsonMatthey

Comitato Organizzatore:

Prof. Ugo Azzena
 Dott. Massimo Carraro
 Dott.ssa Giovanna Delogu
 Dott.ssa Lidia De Luca
 Dott. Davide Fabbri
 Dott. Mauro Marchetti
 Dott.ssa Luisa Pisano
 Dott. Andrea Porcheddu
 Dott.ssa Gloria Rassu
 Dott. Pietro Spanu
 Dott. Pietro Allegrini

Convegno della Divisione di Chimica Organica

**Sassari, 9-13 Settembre 2013
Campus Universitario Via Vienna**

Straightforward Preparation of Biologically Active Dimers of Ferulic Acid

^{1,2}Paola Carta, ²Emanuela Azara, ¹Barbara Scherm, ¹Giovanna Pani, ²Davide Fabbri,
²Maria Antonietta Dettori, ¹Quirico Migheli, ²Giovanna Delogu

¹ Dipartimento di Agraria - Sezione di Patologia Vegetale ed Entomologia, Università degli Studi di Sassari, Viale Italia 39, 07100 Sassari, ² Istituto CNR di Chimica Biomolecolare, UOS Sassari, Traversa La Crucca, 3- Località Baldinca- 07100 Sassari
 paocarta@uniss.it

Ferulic acid (4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Fig. 1) is an ubiquitous phenolic compound in plant tissues, and it constitutes a naturally occurring antioxidant compound found in many foods. The biological effects of this molecule and its esters are of particular interest as efficient inhibitors of trichothecene mycotoxin production by the plant pathogenic fungal species *Fusarium graminearum* and *Fusarium culmorum* which are the most common incitants of Fusarium Head Blight disease in wheat, barley and cereal grain crops. To date, a few synthetic and natural products have been reported as inhibitors of trichothecene biosynthesis. Among them, dehydrodimers of ferulic acid, referred to as dehydrodiferulates DiFAs (Fig. 2), are likely to be involved in plant protection against pathogen invasion (1,2,3).




Figure 1




Figure 2

Here we present different convenient ways to obtain five naturally occurring DiFAs via peroxidase-mediated oxidative coupling reactions or classic cross-coupling oxidations through a sustainable, safe and inexpensive chemistry. Such compounds arise from 5-5', 8-8', 8-5' and 8-O-4' coupling and some of them have been tested as potential inhibitors of micotoxin production *in vitro*.

- (1) Boutigny, A.L.; Atanasova-Pénichon, V.; Benet, M.; Barreau, C.; Richard-Forget, F. *Eur. J. Plant Pathol.* **2010**, *127*, 275-286.
- (2) Merhej, J.; Richard-Forget, F.; Barreau, C. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* **2011**, *91*, 519-528.
- (3) Santiago, R.; Malvar, R. *Int. J. Mol. Sci.* **2010**, *11*, 691-703.

This work has been supported by Sardinia Autonomous Region - L.R. 7 August 2007, n. 7.